

Adnabod nyth Cacwn Asia

Mae cacwn Asia yn gwneud dau fath o nyth, sef prif nythod a nythod eilaidd:

Prif nythod:

- Sfferig â thwll mynediad bach ar y gwaelod, rhwng 5 a 10cm ar ei thraws fel arfer.
- Caiff ei hadeiladu yn y gwanwyn gan frenhines Cacwn Asiaidd unigol, fel arfer mewn lle gwarchodedig megis mieri, gwrych neu mewn / ar adeilad.
- **Mae prif nythod gwenyn meirch a chacwn i gyd yn edrych yn debyg. Dim ond am brif nythod gyda chacwn Asia y dylech roi gwybod. Er mwyn adnabod nyth, cadwch lygad am bryfed o bellter diogel.**

Nythod eilaidd:

- Ar ffurf gellygen, twll mynediad hanner ffordd i fyny'r nyth, hyd at 60 cm o led x 80 cm o uchder.
- Fe'u ceir fel arfer mewn coed ond gallant fod mewn adeiladau a gwrychoedd hefyd.
- **Defnyddiwch ysbiennddrych i adnabod nythod eilaidd o bellter diogel. Peidiwch â tharfu ar nythod a amheur a chiliwch oddi wrth unrhyw nythod gwenyn meirch / cacwn os byddwch yn gweld pryfed hedegog.**


Cacynen Asia,
Vespa velutina



Nythod eilaidd mewn canopi coed yn yr haf (chwirth)



Prif Nyth. Mae nythod gwenyn meirch a chacwn i gyd yn edrych yn debyg. Dim ond os byddwch yn gweld nyth gyda chacwn Asia y dylech roi gwybod amdani.



Rhybudd!

Rhowch wybod am achosion o weld Cacwn Asia a nythod a amheur:

- gan ddefnyddio ap cofnodi iPhone ac Android: '**Asian Hornet Watch**'
- ar-lein yn: nonnativespecies.org/asianhornet
- drwy e-bost: alertnonnative@ceh.ac.uk

Er mwyn cael cymorth i adnabod nyth Cacwn Asia a amheur, neu er mwyn helpu i adnabod nythod, cysylltwch â'ch Tîm Cacwn Asia lleol.

Rhowch wybod am Gacwn Asia:



Dewch o hyd i Dim Cacwn Asia:



Nythod rhywogaethau tebyg

Gellir cymysgu nythod eilaidd cacwn Asia â nythod gwenyn meirch a chacwn eraill, neu wrthrychau mewn coed. Os byddwch yn amau i chi weld nyth cacwn Asia, defnyddiwr ysbienndrych i gadarnhau hynny o bellter diogel cyn rhoi gwybod amdani. Gweler dros y dudalen am fanylion ble i roi gwybod am nythod a sut i gael help i adnabod nyth bosibl.

Cacynen Asia, *Vespa velutina*

Nyth eilaidd:

- Fe'u ceir fel arfer mewn coed ond gallant fod mewn adeiladau a gwrychoedd hefyd.
- Ar ffurf gellygen.
- Twll mynediad hanner ffordd i fyny'r nyth.
- Hyd at 60 cm o led x 80 cm o uchder.



Gwrthrychau eraill mewn coed

- Nythod brain a phiod.
- Uchelwydd.
- Nythod gwiwerod.

Nyth aderyn mewn coeden:



Cacynen Ewropeaidd, *Vespa crabro*

Nyth eilaidd:

- Fel arfer mewn coed cau, simneiau. Anaml y'u ceir yn yr awyr agored.
- Silindrog
- Agoriad llydan ar y gwaelod.
- 30 x 60 cm fel arfer.



Gwenynen feirch ganolwedd, *Dolichovespula media*

Nyth eilaidd:

- Fel arfer mewn llwyni sy'n llai na 2m o uchder.
- Conigol.
- Agoriad bach yn y pen isaf, heb fod yn y canol
- 20 x 25 cm fel arfer.



Prif Nyth:
Mynedfa nodwediadol ar ffurf tiwb (yn wahanol i nyth cacwn Asia).



Gwenynen feirch, *Vespa vulgaris*

Nyth eilaidd:

- Ar y ddaear fel arfer, neu mewn lleoedd cyfyng mewn adeiladau.
- Crwn i gonigol.
- Agoriad bach cudd yn y pen isaf.
- 30 x 35 cm fel arfer.

